

URSAPHARM eusan			
Kunde:	Export EC - ALEXIAPHARMA S.A.	Lackierung:	/
Produkt:	PB HYLO-COMOD 10 ML ATRO EC	Lackausparung:	☐ /
Art.-Nr.:	90.2673	Pharmacode:	1202
Format:	185 x 275 mm (Plano)	Zusatzspezifikation:	/
Blindenschrift (FS):	JA / NEIN	Sonstiges:	/
Material:	60 g/gm - Offset UPM Fine / Amber Graphic / Sora Medico / Primabrite Brilliant	Kleinste Schriftgröße:	11 pt
Kleber (ET):	/	Farbtoleranz vorhanden:	JA / NEIN Nr.: FTK_UPH_
Farbe 1:	☒ Schwarz (1/1-fbg.)	Farbtoleranz fertigen:	JA / NEIN Nr.: FTK_UPH_
Farbe 2:	☐ /	(6-fache Ausfertigung)	
Farbe 3:	☐ /		
Farbe 4:	☐ /	Korrekturabzug Nr.:	1 (Mock-up)
Farbe 5:	☐ /	Erstellt:	16.04.2024 C. Staab
Farbe 6:	☐ /	Freigabe Kunde:	
Farbe 7:	☐ /	Endfreigabe/Gut zum Druck:	

Instrucciones de uso

Por favor lea esta información con atención.
Le será útil para aplicar HYLO COMOD® correctamente.

HYLO COMOD®

Hialuronato de sodio 1 mg/ml

Colirio estéril libre de fosfatos y sin conservantes.

¿Qué es HYLO COMOD®?

HYLO COMOD® es una solución estéril para uso oftálmico, sin conservantes y libre de fosfatos.

Composición:

1 ml de HYLO COMOD® contiene 1 mg de hialuronato de sodio, ácido cítrico anhidro, citrato de sodio, sorbitol y agua para inyecciones.

¿Para qué se utiliza HYLO COMOD®?

HYLO COMOD® mejora la lubricación de la superficie ocular, en ojos que debido a condiciones medioambientales o en tratamiento postoperatorio oftálmico, padecen sequedad, escozor o sensación de cuerpo extraño.

¿Cuándo debe aplicarse HYLO COMOD®?

En todos los casos de sequedad ocular. Picazón, escozor, ojos fatigados o sensación de cuerpo extraño son síntomas de que el ojo no tiene la humedad suficiente. La película lagrimal natural, que cubre la superficie del ojo, se rompe con mayor rapidez si usted está mucho tiempo en una habitación con aire acondicionado o después de un trabajo intenso frente al ordenador. Para que su tejido ocular funcione adecuadamente, éste necesita estar continuamente lubricado por una película lagrimal normal.

La producción fisiológica de lágrimas puede disminuir debido a intervenciones quirúrgicas oftálmicas o lesiones oculares. Para la regeneración de estos tejidos es necesaria una lubricación adecuada y continua. La aplicación de HYLO COMOD® proporciona una hidratación de larga duración a la córnea y a la conjuntiva, contribuyendo al proceso fisiológico de cicatrización de las heridas.


HYLO COMOD® contiene la sal sódica del ácido hialurónico, una sustancia natural que se encuentra en el ojo y en otras partes del cuerpo. Su especial característica es que forma una película lubricante e hidratante, estable y de larga duración en la superficie del ojo. Además, no produce visión borrosa. Protege los ojos de la sequedad y la irritación durante mucho tiempo.

Esto es especialmente importante también si usted usa lentes de contacto, porque éstos necesitan suficiente líquido lagrimal para no causar ninguna molestia. HYLO COMOD® es compatible con lentes de contacto. Mediante el empleo de HYLO COMOD®, el uso de lentes de contacto se hará mucho más cómodo, ya que no forma costras o depósitos, al contrario protege la superficie de la córnea.

HYLO COMOD® no contiene conservantes, por lo que en general es bien tolerado, ni fosfatos, lo cual evita posibles complicaciones debidas a la formación de depósitos insolubles en la córnea.

¿Cómo debe aplicarse HYLO COMOD®?

Use únicamente si el precinto de la caja está intacto antes del primer uso.




Paso 1:

Retire el tapón antes de cada aplicación. Antes de la primera aplicación de HYLO COMOD®, mantenga verticalmente el envase con la punta hacia abajo y presione arriba hasta que salga la primera gota de la boquilla. Ahora puede proceder a las siguientes aplicaciones.




Paso 2:

Mantenga el envase con el gotero hacia abajo, de forma que el pulgar presione abajo del envase y el resto de los dedos se sitúen arriba.



Paso 3:

Durante la aplicación, evite el contacto de la punta del envase con el ojo o la piel. Incline la cabeza un poco hacia atrás, exponga suavemente hacia abajo del párpado inferior y presione arriba del envase. De esta forma se activa el mecanismo para la liberación de una gota. Gracias a la tecnología especial de la válvula de HYLO COMOD®, el tamaño y la velocidad de la gota son idénticos, todas las gotas, independientemente de la presión que se ejerza. Cierre lentamente los ojos para que el líquido se distribuya de forma homogénea sobre la superficie del ojo.



Paso 4:

Después de la aplicación, sacuda para que no quede residuo en la boquilla y coloque enseguida el tapón.

Un frasco con 10 ml de solución corresponde a aproximadamente 300 gotas. Por razones técnicas, siempre queda un pequeño resto en el envase.

Un frasco con 5 ml de solución corresponde a aproximadamente 150 gotas. Por razones técnicas, siempre queda un pequeño resto en el envase.



La frecuencia de uso de HYLO COMOD® no es limitada. Cada envase de HYLO COMOD® debe ser utilizado por una única persona.

Otras indicaciones a tener en cuenta en la aplicación

Si no se siente mejor o si se siente peor después de varios días de uso, hable con su médico.

Si está utilizando otros colirios, espere al menos 30 minutos entre las aplicaciones de los mismos. En ese caso, HYLO COMOD® deberá ser siempre el último en aplicarse. Sin embargo, los ungüentos oftálmicos siempre deben administrarse después de usar HYLO COMOD®.

Debido a que HYLO COMOD® no contiene conservantes, puede ser empleado para tratamientos de larga duración. En muy raras ocasiones se han descrito reacciones adversas como hipersensibilidad, escozor, lagrimeo excesivo, dolor, sensación de cuerpo extraño u otras irritaciones locales temporales que desaparecieron tras suspender el uso de HYLO COMOD®.

Tenga en cuenta que después de la aplicación de HYLO COMOD® en alguna ocasión podría producirse momentáneamente visión borrosa debido a la viscosidad de la solución oftálmica. En muy raras ocasiones, esto puede causar dolor de cabeza temporal en pacientes muy sensibles.

HYLO COMOD® es compatible con lentes de contacto. Después de ponerse los lentes de contacto y antes de aplicar HYLO COMOD®, se recomienda esperar unos 30 minutos para evitar posibles reacciones de incompatibilidad entre los productos que se utilizan para el mantenimiento de los lentes de contacto e HYLO COMOD®.

Según los conocimientos existentes, HYLO COMOD® puede aplicarse también en niños y en mujeres embarazadas o en período de lactancia.

¿Con qué frecuencia y durante cuánto tiempo puede aplicarse HYLO COMOD®?

Debería utilizarse de acuerdo a las instrucciones recibidas por su oftalmólogo. En general, se aplica una gota de HYLO COMOD® tres veces al día en el saco conjuntival. En caso de molestias más fuertes podría aplicarse más gotas en el transcurso del día. Si tuviera que aplicar HYLO COMOD® más a menudo (por ejemplo, más de 10 veces al día), consulte a su oftalmólogo. HYLO COMOD® es apropiado para tratamientos de larga duración. No obstante, si las molestias persisten debe consultar a su oftalmólogo.

¿Cuándo no debe aplicarse HYLO COMOD®?

En casos de hipersensibilidad a alguno de sus componentes.

Indicaciones para la conservación de HYLO COMOD®

Conservar a temperatura ambiente. HYLO COMOD® puede aplicarse hasta 6 meses después de su apertura inicial.

No aplicar después de la fecha de caducidad.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Presentaciones disponibles:

Dispositivo de 10 ml

Dispositivo de 5 ml

Fecha de la información:

Febrero 2023

Fabricante (ﷲ):

URSAPHARM Arzneimittel GmbH

Industriestraße 35

66129 Saarbrücken

Alemania

Fabricado para ALEXXIAPHARMA S.A. (Quito – Ecuador)

Por URSAPHARM (Saarbrücken – Alemania)

Importado y distribuido por:

ALEXXIAPHARMA S.A. (Quito – Ecuador)

Reg. San. Alemania: HD 60132728 0001

Reg. San. Ecuador: 2677-DME-0617

VENTA LIBRE

STERILE A

